




# 30<sup>th</sup> International Conference Cardiology *today*

14 -15 March 2026  
Hilton Nicosia

PROGRAMME  
BOOKLET



Under the  
auspices of:



  
**forxiga**<sup>®</sup>  
(dapagliflozin)

**Όταν η  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
γίνεται  
ΕΠΙΛΟΓΗ**



**Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2:** Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ως συμπληρωματική θεραπεία στη διαίτα και την άσκησης μονοθεραπεία, όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας. Επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

**Καρδιακή ανεπάρκεια:** Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

**Χρόνια νεφρική νόσος:** Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Για τα αποτελέσματα των μελετών σε σχέση με τον συνδυασμό των θεραπειών, τις επιδράσεις στον γλυκαιμικό έλεγχο, τα καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάντα και τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν, βλέπε παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.1. της ΠΧΠ.

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΣΔτ2, ήταν οι γεννητικές λοιμώξεις. Πολύ συχνές η υπογλυκαιμία όταν συγχρησιάζεται με SU ή ινσουλίνη. Άλλες συχνές που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: ζάλη, εξάνθημα, οσφυαλγία, δυσουρία, πολυουρία, αυξημένος αιματοκρίτης, μειωμένη νεφρική κάθαρση κρεατινίνης κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας, δυσλιπιδαιμία. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της dapagliflozίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο ήταν συνεπές με το γνωστό προφίλ ασφάλειας της dapagliflozίνης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ΠΧΠ για την πλήρη λίστα ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Forxiga F.C Tab 10mg/tab Btx28**

Κάθε δισκίο περιέχει μονοδερική dapagliflozίνη με προπρανολόλη ισοδύναμη με 10 mg dapagliflozίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ενδεικτικές Λ.Τ. κατά την έκδοση Λ.Τ. €49,34

Το φάρμακο αποζημιώνεται από το ΓεΣΥ.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη ΠΧΠ που μπορείτε να βρείτε στο QR code ή στο [www.papaloizou.com](http://www.papaloizou.com)



**AstraZeneca** 

**Αλεκτώρ**  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Λεωφόρος Κιλκίς 35  
2234 Λατσία, Κύπρος  
Τηλ: +357 22 490305  
[www.papaloizou.com](http://www.papaloizou.com)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

# CONTENTS



<a href="#"><u>Welcome Message from Conference Chair</u></a>	<a href="#"><u>7</u></a>
<a href="#"><u>Organizing Committee</u></a>	<a href="#"><u>9</u></a>
<a href="#"><u>Programme</u></a>	<a href="#"><u>12</u></a>
<a href="#"><u>Πρόγραμμα Ημερίδας Ομάδας Εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής της ΚΕΚ</u></a>	<a href="#"><u>20</u></a>
<a href="#"><u>Speakers</u></a>	<a href="#"><u>26</u></a>
<a href="#"><u>Chairs</u></a>	<a href="#"><u>30</u></a>
<a href="#"><u>E-Poster Presentations</u></a>	<a href="#"><u>34</u></a>
<a href="#"><u>Sponsors</u></a>	<a href="#"><u>38</u></a>


# Η προστασία δεν σταματάει ποτέ

Προσφέρετε την υποστήριξη που χρειάζονται οι ασθενείς σας **στην κάθε τους μέρα**



# Vyndaqel<sup>®</sup>

(*tafamidis*)



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



For healthcare professionals only.

Transform LDL-C management

**Choose LEQVIO<sup>®</sup>  
for early, strong  
and sustained  
LDL-C reduction**<sup>\*1-5</sup>LEQVIO<sup>®</sup> uniquely lowers LDL-C<sup>†</sup> with two injections a year (after 2 initial doses)<sup>‡</sup>, helping your eligible patients reach their LDL-C goal early and maintain it over the long-term.<sup>§1-5</sup>

<sup>\*</sup> In clinical trials, LEQVIO<sup>®</sup> allowed most patients to achieve their LDL-C goals by Day 30 (80.8% vs 11.3% with SOC; N=1,770)<sup>1</sup> and provided 52.3% LDL-C reduction at Month 17 (mean difference vs placebo from baseline [N=1,561; 95% CI: -56, -49; p<0.0001]) on top of statins<sup>1,3</sup> in line with the ESC 2025 guidelines (minimum 50% reduction after an event).<sup>5</sup> LDL-C reduction was maintained during each 6-month dosing interval.<sup>1,3</sup>

<sup>†</sup> From baseline.

<sup>‡</sup> LEQVIO<sup>®</sup> is administered as single subcutaneous injections at the start of treatment, again at 3 months and every 6 months thereafter.<sup>1</sup>

<sup>§</sup> The main adverse events observed with LEQVIO<sup>®</sup> in clinical trials were mostly mild injection-site reactions (8.2% with LEQVIO<sup>®</sup> vs 1.8% with placebo).<sup>1</sup>

Not a real patient.

LEQVIO<sup>®</sup> (inclisiran) is indicated as adjunct to diet and maximally tolerated statin therapy for the treatment of adults with primary hyperlipidemia (including heterozygous familial hypercholesterolemia (HeFH)) to reduce low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C).<sup>1</sup>

CI, confidence interval; ESC, European Society of Cardiology; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; SOC, standard of care

**References:** 1. Leqvio<sup>®</sup> Summary of Product Characteristics- 30.07.2025. 2. Wright RS, Raal FJ, Koenig W, et al. Inclisiran administration potently and durably lowers LDL-C over an extended-term follow-up: the ORION-8 trial. *Cardiovasc Res.* 2024;120(12):1400-1410. doi:10.1093/cvr/cvae109. 3. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. *N Engl J Med.* 2020;382(16):1507-1519. doi:10.1056/NEJMoa1912387. 4. Landmesser U, Laufs U, Schatz U, et al. Inclisiran-based treatment strategy in hypercholesterolaemia: the VICTORION-Difference trial. *Eur Heart J.* 2025;doi:10.1093/eurheartj/ehaf685. 5. Ray KK, Landmesser U, Leiter LA, et al. Inclisiran in patients at high cardiovascular risk with elevated LDL cholesterol. *N Engl J Med.* 2017;376(15):1430-1440. doi: 10.1056/NEJMoa1615758. 6. Mach F, Koskinas KC, Roeters van I ennep JF, et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Developed by the task force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J.* 2025. doi:10.1093/eurheartj/ehaf190.

**Pack and price:** LEQVIO solution for Injection 284mg/1.5ml In pre-filled syringe (with needle guard): €2394,08.

**Reporting of suspected adverse reactions:** Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions to: Novartis Pharma Services Inc., Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690 (Pharmacovigilance Department), Fax: +357 22 315032 or to Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Tel: +357 22 608 632/661, Fax: +357 22 608 649, by completing the Yellow Card which is available to the public pharmacies or electronically in the website www.kitrinikarta.gov.cy.





## Welcome Message from Conference Chair

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, it is our great pleasure to welcome you to the **30<sup>th</sup> International Conference 'Cardiology Today'**, organized by the Cyprus Society of Cardiology, which will take place in Nicosia on the 14<sup>th</sup> – 15<sup>th</sup> of March 2026.

This conference, celebrating this year its 30th anniversary, not only reflects its consistent scientific excellence and its commitment to highlighting achievements and progress in the field of cardiology, but also represents the strong, sincere, and longstanding presence of our scientific society.

The participation of distinguished speakers from Cyprus who demonstrate an outstanding career abroad (USA, UK, Switzerland), recognized for their prestigious scientific contribution, guarantees the high academic standard and educational character of the congress and proves, something that we are proud of, the fact that a whole Cypriot cardiology community represents our small country all over the world.

Joint sessions with regional national cardiology societies (Greece, Lebanon, Malta) contribute to scientific exchange and foster a spirit of cooperation and collegiality, while the presentation of clinical cases and moderated posters from various cardiology clinics of the island highlights the important work carried out within them.

All these, accompanied by the enthusiasm of various speakers from numerous cardiology clinics of Cyprus, who are always eager and willing to enhance the scientific content of our meetings.

The selected topics address all issues relevant to the modern cardiologist, and we hope that their presentation will stimulate fruitful and productive discussion, as well as provide an opportunity for in-depth professional development for all participants.

The participation of cardiology trainees is reflected through their case presentations session and in the lunch break session, following the tradition of European cardiology meetings, as well as through the e-poster presentations. This year a moderated e-poster session for medical students is also included in the program. A parallel half-day meeting of the working group of the Cardiology Nursing of our Society has also been scheduled. Lastly, an anniversary issue of our e-journal 'the Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine' has been published.

We would like to express our sincere thanks to everyone who contributed to the realization of this conference. Special thanks are extended to our sponsors, pharmaceutical and other companies, whose continued and genuine support makes the organization of such scientific meetings possible.

With these thoughts, we look forward to your active participation and invite you to embrace one of the leading scientific meetings of cardiology in our country.

We welcome you and promise you warm hospitality.

On behalf of the organizing committee

**Dr Kyriakos Yiangou**

President,  
Cyprus Society of Cardiology

**CAMZYOS®**  
(mavacamten) 2.5, 5, 10, 15mg  
capsules

Ο πρώτος εγκεκριμένος αναστολέας της καρδιακής μυοσίνης για την αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ΝΥΗΑ)<sup>1,2</sup>

**2x**

περισσότεροι ασθενείς βελτίωσαν την κατηγοριοποίηση κατά ΝΥΗΑ κατά ≥1 κατηγορία έναντι του εικονικού φαρμάκου

**>20x**

μείωση στη μέση κλίση στον LVOT μετά από άσκηση έναντι του εικονικού φαρμάκου



**ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ**  
Με εξατομικευμένη δοσολογία για βέλτιστες εκβάσεις

Το CAMZYOS® ενδείκνυται για τη θεραπεία της συμπτωματικής (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ΝΥΗΑ) αποφρακτικής υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας<sup>1</sup>

ΝΥΗΑ = Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

#### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CAMZYOS, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2025. 2. Olivotto I, Oreziak A, Barriaes-Villa R, et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10253):759-769.

#### ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του CAMZYOS® ήταν ζάλη (17%), δύσπνοια (12%), συστολική δυσλειτουργία (5%) και συγκοπή (5%)<sup>1</sup>

#### ΕΛΛΑΔΑ

Λιανική τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)\*

CAMZYOS CAPS 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, CAP BTX28 (2X14) CAPS ΣΕ BLISTER (PVC/PCTFE/ALU): €1.443,68

\*Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2025

#### ΚΥΠΡΟΣ

Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή με ΦΠΑ\*

CAMZYOS CAPSULE, HARD 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, PACK WITH 28 CAPS IN BLISTER(S): €1.602,21

\*Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Φεβρουαρίου 2026

#### ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής

Κύπρος: Με ιατρική συνταγή

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337

Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607,

Φαξ: + 357 22608669 Ιστότοπος: [www.moh.gov.cy/phs](http://www.moh.gov.cy/phs)

Αρ. άδειας: 76003/04-10-2023

 **Bristol Myers Squibb®**

Bristol-Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,

Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400

Φαξ 210 6074333

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας ή μέσω σάρωσης του παρακάτω QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: 05/2025

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**  
[www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr)  
[www.kitrinikarta.gov.cy](http://www.kitrinikarta.gov.cy)

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



## Organizing Committee Board of Directors / Cyprus Society of Cardiology

Kyriakos Yiangou – President

Joseph Moutiris – Vice President

Maria Karakyriou – Secretary

Evagoras Economides –Assistant Secretary

Nicoletta Orphanou – Treasurer

Antonis Ioannou – Member

Thrasos Constantinides – Member

Christos Eftychiou – Member

Hera Heracleous – Past President

Conference Management Company



Website: [www.cyprusconferences.com](http://www.cyprusconferences.com)  
E-mail: [synedrio@topkinisis.com](mailto:synedrio@topkinisis.com) | Tel.: +357 22713780

40<sup>\*</sup>  
YEARS

MERCK

Concor<sup>®</sup>

Υπέρταση  
Στεφανιαία Νόσος

Emconcor<sup>®</sup>  
BISOPROLOL FUMARATE

Καρδιακή Ανεπάρκεια

**Καρδιόσχημο**  
δισκίο για  
**εύκολη**  
**αναγνώριση**

Concor<sup>®</sup> 5mg & 10mg, Emconcor<sup>®</sup> 2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Concor<sup>®</sup> 5mg & 10mg: κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 5mg ή 10mg bisoprolol fumarate, Emconcor<sup>®</sup> 2,5mg: κάθε δισκίο περιέχει 2,5mg bisoprolol fumarate.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη ΠΧΠ που μπορείτε να βρείτε στο QR code ή στο [www.papaloizou.com](http://www.papaloizou.com)

Ενδεικτική Λ.Τ. κατά την έκδοση:

EMCONCOR FC TABLETS 2.5mg 30tbs 6.08€

CONCOR TABLETS 5mg 30tbs 6.80€

CONCOR TABLETS 10mg 30tbs 7.80€

Συμβουλευτείτε τον τελευταίο ενημερωμένο Ενιαίο Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Αποζημιώνεται από το ΓΕΣΥ.

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

\*First Marketing Authorization for Bisoprolol was granted in Germany.

Concor<sup>®</sup>  
5mg & 10mg



Emconcor<sup>®</sup>  
2,5mg



**Papaloizou**

Χρ. Γ. Παπαλιώζου Λτδ  
Λεωφόρος Κιλκίς 35, 2234 Λατσία  
Τηλ. 22490305 / Fax 22490308  
[www.papaloizou.com](http://www.papaloizou.com)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**  
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

MERCK



# PROGRAMME

**SATURDAY 14 MARCH**

08:30 - 09:00 Registrations

**09:00 - 10:00 SESSION 1: CARDIOVASCULAR IMAGING MODALITIES**

Chairs: Michael Myrianthefs, Nicoletta Orphanou

09:00 - 09:20 The role of cardiac computed tomography in clinical practice of the modern cardiology  
**Theodoros NTOSKAS / Cyprus**09:20 - 09:40 Innovations in modern MPI practice and contribution of digital SPECT imaging in CFR measurement  
**Daniel HADJIFOTIADES / Cyprus**09:40 - 10:00 Stress CMR - Current practices and justification in the evidence-based era  
**Panayiotis TSIVERDIS / Cyprus****10:00 - 11:30 SESSION 2: CARDIOVASCULAR PREVENTION**

Chairs: Thrasos Constantinides, Pambis Nicolaidis

10:00 - 10:20 Cardiac prevention beyond traditional risk factors  
**Vassilios VASSILIOU / UK**10:20 - 10:40 Vaccines in Cardiovascular Disease: From Evidence to Implementation  
**Antonis IOANNOU / Cyprus**10:40 - 11:00 Nicotine and the cardiovascular system. Various forms, various challenges  
**Kyriakos YIANGOU / Cyprus**11:00 - 11:30 The Cyprus National Strategy for cardiovascular diseases  
**Hera HERACLEOUS / Cyprus**

11:30 - 12:00 COFFEE BREAK

**12:00 - 13:00 SESSION 3: ARRHYTHMIAS**

Chairs: Panayiotis Avraamides, Joseph Moutiris

12:00 - 12:20 Differential diagnosis of broad complex tachycardia  
**Elias PAPASAVVAS / Cyprus**12:20 - 12:40 Wearable technologies in cardiac rhythm management. From the wrist to the heart and beyond  
**Kyriakos MOUYIS / Cyprus**12:40 - 13:00 Prevention and early detection of atrial fibrillation  
**Stavros STAVRAKIS / USA****13:00 - 14:00 OPENING CEREMONY****Addresses by:**

- Kyriakos Yiangou, President of Cyprus Society of Cardiology
- Petros Agathangelou, President of the Cyprus Medical Association
- Petros Rodotheou, Ministry of Health Representative

**Distinguished Lecture: Stelios Kyriakides**

The Champion - the Pioneer Athlete - the Patriot - the Humanitarian  
(80 years from the legendary Boston Marathon)

**Demetrios KYRIAKIDES**



14:00 - 15:00 LIGHT LUNCH  
Moderated e-poster presentations (Cardiology Residents)



15:00 - 16:00 **SESSION 4: ARTIFICIAL INTELLIGENCE**  
Chairs: Theodoros Christodoulides, Antonis Ioannou

15:00 - 15:20 Using AI for cardiovascular risk assessment: Experience from UK's NHS  
**Charalambos ANTONIADES / UK**

15:20 - 15:40 Expainable AI in the assessment of cardiovascular risk prediction. The Cyprus Perspective  
**Chara SKOUTELI / Cyprus**

15:40 - 16:00 Artificial Intelligence-guided transcatheter interventions for valvular heart diseases: a glimpse into the (near) future  
**Georgios GEORGIU / Cyprus**

16:00 - 17:00 **SESSION 5: CARDIAC SURGERY**  
Chairs: Savvas Constantinides, Erotokritos Evangelakis

16:00 - 16:20 Tricuspid transcatheter Edge-to-Edge Repair: Prognosis Shaping Intervention or High-Tech Palliation?  
**Andreas MITSIS / Cyprus**

16:20 - 16:40 Minimally invasive heart surgery - Tomorrow's standard  
**Nestoras PAPADOPOULOS / Switzerland**

16:40 - 17:00 What is the optimal valve substitute for aortic valve replacement?  
**Mario PETROU / UK**

17:00 - 17:30 COFFEE BREAK  
Moderated e-poster presentations (Medical Students)

17:30 - 18:30 **SESSION 6: HEART FAILURE**  
Chairs: Petros Agathangelou, Evagoras Economides

17:30 - 17:50 A practical update on CHF  
**Vassilios VASSILIOU / UK**

17:50 - 18:10 Heart failure and atrial fibrillation. A bidirectional relationship  
**Stavros STAVRAKIS / USA**

18:10 - 18:30 Advanced Heart Failure - How to recognize, when and who to refer for advanced therapies  
**Theodoros CHRISTODOULIDES / Cyprus**

18:30 - 19:00 Medications and devices strengthening hearts: from the 60's to nowadays and beyond  
**Stavros DRAKOS / USA**

END OF 1<sup>ST</sup> DAY



PMI SCIENCE  
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

## Δημιουργούμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από το τσιγάρο

Αναπτύσσουμε εναλλακτικά προϊόντα  
χωρίς καύση και αξιολογούμε  
τις επιπτώσεις τους στην ατομική  
και τη δημόσια υγεία χρησιμοποιώντας  
αυστηρές επιστημονικές μεθόδους

Γνωρίστε το PMI Science  
[pmiscience.com](http://pmiscience.com)

PMI Science

@pmiscience



*Το παρόν απευθύνεται μόνο σε επιστήμονες  
και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας*

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ



## SUNDAY 15 MARCH

08:30 - 09:00 Registrations

### 09:00 - 10:00 SESSION 1: **CARDIOMYOPATHIES**

Joint Session with the Maltese Society of Cardiology

Chairs: Hera Heracleous, Evagoras Nicolaidis

09:00 - 09:20 Physiology or Cardiomyopathy? The role of multimodality imaging to assess athletes in the grey zone  
**Mark ABELA / Malta**

09:20 - 09:40 Unraveling amyloidosis through cardiac imaging  
**Alex BORG / Malta**

09:40 - 10:00 Novelties in diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy  
**Georgia DANIEL / Cyprus**

### 10:00 - 11:00 SESSION 2: **VALVULAR HEART DISEASES**

Joint Session with the Lebanese Society of Cardiology

Chairs: Loizos Antoniadis, Maria Karakyriou

10:00 - 10:20 Three-dimensional Echocardiographic evaluation of mitral regurgitation: Anatomical and clinical Implications  
**Georges SAADE / Lebanon**

10:20 - 10:40 Multimodality imaging in Bicuspid Aortic Valve  
**Elie CHAMMAS / Lebanon**

10:40 - 11:00 The added value of CMR in the assessment of Valvular Heart Diseases,  
**Thrasos CONSTANTINIDES / Cyprus**

11:00 - 11:30 COFFEE BREAK

### 11:30 - 12:30 SESSION 3: **STRUCTURAL HEART DISEASES**

Joint Session with the Hellenic Society of Cardiology

Chairs: Georgios Georgiou, Kyriakos Yiangou

11:30 - 11:50 TAVI: Long term results of biological valves  
**Konstantinos TOUTOUZAS / Greece**

11:50 - 12:10 Functional mitral regurgitation TEER management: a step by step approach  
**Lambros MICHALIS / Greece**

12:10 - 12:30 Valve in Valve TAVI  
**Christos EFTYCHIOU / Cyprus**

### 12:30 - 13:30 SESSION 4: **CASE PRESENTATIONS**

Chairs: Christos Eftychiou, Joseph Moutiris

12:30 - 12:45 • Georgia Karmioti - Nicosia GH

12:45 - 13:00 • Elena Leonidou - Limassol GH

13:00 - 13:15 • Michaella Kyriacou - Nicosia GH

13:15 - 13:30 • Menelaos Athanasiades - Paphos GH

13:30 - 13:45 • Alexandros Vassiliades - Larnaca GH

13:45 - 14:30 **WORKSHOP**  
LVAD - PATIENT MANAGEMENT

END OF CONFERENCE



# Plavix

clopidogrel (as hydrogen sulphate)



## Χορηγείται μόνο με Ιατρική Συνταγή

PLAVIX TABLET, FILM COATED 75MG PACK WITH 28 TABS IN BLISTER(S) Λιανική τιμή : € 13,98 | Διατίθεται από το ΓεΣΥ κατόπιν αποπληρωμής σχετικής συνεισφοράς.

PLAVIX TABLET, FILM COATED 300MG PACK WITH 10 TABS IN BLISTER(S) Λιανική τιμή: € 56,49 | Πλήρως επιχορηγημένο από το ΓΕΣΥ.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR CODE



**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα, συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**sanofi** |  **PAPAELLINAS**  
GROUP

PAPAELLINAS GROUP  
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ SANOFI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

PAPAELLINAS LTD, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2234, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Τηλ.: +357 22741741, Φαξ: +357 22482155

SAN/ADV/CY/COM/PLA/001/FEB2026  
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: Φεβρουάριος 2026

# ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του<sup>1,2</sup>



Το Repatha<sup>®</sup> μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)<sup>3</sup> και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμίμπη.<sup>1-5</sup>

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha<sup>®</sup> (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: October 2020. Available at: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf). 3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Ημερομηνία δημιουργίας: Νοέμβριος 2020  
©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος  
Λιανική τιμή: 259.32€

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό Προϊόν που χορηγείται με Ιατρική Συνταγή

Φαρμακευτικό Προϊόν πλήρως επιχορηγημένο από το ΓεΣΥ

CYP-145-1124-80002

Πριν την συνταγογράφηση, συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



# NAXAT

rivaroxaban **15mg** | 20mg

για να  
κυλά η ζωή  
χωρίς εμπόδια

## STATOL

rosuvastatin

5mg

10mg

20mg

40mg

## STATEZOL

rosuvastatin/ezetimibe

5mg/10mg

10mg/10mg

20mg/10mg

40mg/10mg

Για μια  
καρδιά  
γεμάτη υγεία



Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17, Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates,  
Lefkosia, Cyprus. P.O. Box: 28629, 2081 Lefkosia, Cyprus.  
T. +357 22 845 000, [www.delorbispharma.eu](http://www.delorbispharma.eu)

Stay connected with us on social





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΚ

## Πρόγραμμα Ημερίδας Ομάδας Εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής της ΚΕΚ

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026

Αίθουσα Dionysus

08:00 - 08:45 Εγγραφές

08:45 - 09:00 Χαιρετισμοί / Επίσημη Έναρξη

### 09:00 - 10:00 Σύνοδος 1: Κλινικές Περιπτώσεις

Προεδρείο: **Χαράλαμπος Πίττας, Ρογήρος Γεωργίου**

Όταν η ορμονική προετοιμασία γίνεται Θρομβοεμβολή: Κλινικό περιστατικό Πνευμονικής Εμβολής με εκτεταμένη Εν Τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση.

**Λάουρα Πάρη, Δρ. Μαρίνος Σωτηρίου, Δρ. Μαρία Βανέζη, Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού**

Επιγαστραλγία ως άτυπη συμπτωματολογία OEM σε 39χρονη ασθενή: Case study.

**Στέλλα Κωνσταντίνου, Δρ. Μαρίνος Σωτηρίου, Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού**

Διαχείριση Ανθεκτικής Κοιλιακής Μαρμαρυγής: Σύγχρονη Προσέγγιση με Έμφαση στην Αλλαγή Διανύσματος και τη Νοσηλευτική Ηγεσία.

**Νίκος Σάββα**

### 10:00 - 10:40 Σύνοδος 2: Σύγχρονα Τεχνολογικά Μέσα στην Καρδιογενή Καταπληξία

Προεδρείο: **Νίκη Βουρή, Μάριος Πιστόλας**

Η επίδραση της εξωσωματικής μεμβράνης οξυγόνωσης και της ενδοαορτικής αντλίας σε ασθενείς με καρδιογενή καταπληξία: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.

**Δέσπω Καρατζιά**

Καρδιογενής καταπληξία: Από την αναγνώριση στη μηχανική υποστήριξη.

**Δρ. Μάρθα Κυριάκου**

10:40 - 11:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ



## 11:10 - 12:10 Σύνοδος 3: Νεώτερες Ερευνητικές Εξελίξεις

Προεδρείο: **Αγγέλα Μαλακτού, Αποστόλης Γατίδης**

Εγκυροποίηση της Ελληνικής έκδοσης του εργαλείου για την Επιβάρυνση φροντιστών ατόμων με Καρδιακή Ανεπάρκεια.

**Καίτη Μύριαμ Μεττούρη**

Καρδιαγγειακός κίνδυνος στις ρευματικές διαταραχές: Από τη συστηματική διαταραχή στη λειτουργική έκπτωση.

**Νικολέτα Νικολάου**

Νεώτερα δεδομένα από την μελέτη INFINITY

**Δρ. Ανδρέας Μήτσης, Μιχαήλ Δρακομαθιουλάκης, Δρ. Αικατερίνη Τσιακτάνη, Δρ. Σωτήριος Κ. Τασούλης, Δρ. Ιωάννης Λακουμέντας, Δρ. Γεωργία Καρμιώτη, Δρ. Μιχαέλα Κυριάκου, Δρ. Στέφανος Σωκράτους, Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Στέργιος Τζίκας, Δρ. Νικόλαος Π.Ε. Καδόγλου, Δρ. Γεώργιος Κασίμης**

## 12:10 - 12:50 Σύνοδος 4: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας

Προεδρείο: **Δρ. Αντρέας Πρωτοπαππάς, Αφροδίτη Ευριπίδου**

Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική για ποιον;

**Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού**

Καταληκτικοί ασθενείς: Προτεραιότητα στις επιθυμίες τους ή εφαρμογή όλων των διαθέσιμων ιατρονοσηλευτικών μέσων;

**Μιχαήλ Δρακομαθιουλάκης**

## 12:50 - 13:10 Ανακοινώσεις προς τα Μέλη της Ο.Ε. / Επίσημη Λήξη

Η Ημερίδα έχει μοριοδοτηθεί με 3,3 Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ICNECs) από τον ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.

once weekly

# mounjaro

(tirzepatide) injection

A Lilly Medicine

# TOGETHER, REACHING WEIGHT LOSS GOALS IS POSSIBLE<sup>1</sup>



Actor portrayals. Not actual patients or healthcare providers.



## The first-and-only approved GIP and GLP-1 RA<sup>1</sup>



## Significant weight loss<sup>1</sup>



## Improvements in key cardiometabolic parameters<sup>2</sup>

### INDICATION<sup>1</sup>

Mounjaro is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of the SmPC for the product, on how to report adverse reactions to the authorities.

**ABBREVIATED PRESCRIBING INFORMATION.**

For Qualitative and quantitative composition please see the full SmPC on the European Medicines Agency (EMA) website: <http://www.ema.europa.eu>, and/or on European Commission website: <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/>. Pharmaceutical form: Solution for injection (injection). Clear, colourless to slightly yellow solution. Therapeutic indications: Type 2 diabetes mellitus. Mounjaro is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes. For study results with respect to combinations, effects on glycaemic control and the populations studied, see sections 4.4, 4.5 and 5.1 of the full Prescribing Information. Weight management: Mounjaro is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management, including weight loss and weight maintenance, in adults with an initial Body Mass Index (BMI) of  $\geq 30 \text{ kg/m}^2$  (obesity) or  $\geq 27 \text{ kg/m}^2$  to  $< 30 \text{ kg/m}^2$  (overweight) in the presence of at least one weight-related comorbid condition (e.g., hypertension, dyslipidaemia, obstructive sleep apnoea, cardiovascular disease, prediabetes, or type 2 diabetes mellitus). For trial results with respect to obstructive sleep apnoea (OSA), see section 5.1 of the full Prescribing Information. Posology: The starting dose of tirzepatide is 2.5 mg once weekly. After 4 weeks, the dose should be increased to 5 mg once weekly. If needed, dose increases can be made in 2.5 mg increments after a minimum of 4 weeks on the current dose. The recommended maintenance doses are 5 mg, 10 mg and 15 mg. The maximum dose is 15 mg once weekly. When tirzepatide is added to existing metformin and/or sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor (SGLT2) therapy, the current dose of metformin and/or SGLT2 can be continued. When tirzepatide is added to existing therapy of a sulphonylurea and/or insulin, a reduction in the dose of sulphonylurea or insulin may be considered to reduce the risk of hypoglycaemia. Blood glucose self-monitoring is necessary to adjust the dose of sulphonylurea and insulin. A stepwise approach to insulin reduction is recommended. Special populations: Elderly, gender, race, ethnicity or body weight: No dose adjustment is needed based on age, gender, race, ethnicity or body weight. Only very limited data are available from patients aged  $\geq 85$  years. Renal impairment: No dose adjustment is required for patients with renal impairment including end-stage renal disease (ESRD). Experience with the use of tirzepatide in patients with severe renal impairment and ESRD is limited. Caution should be exercised when treating these patients with tirzepatide. Hepatic impairment: No dose adjustment is required for patients with hepatic impairment. Experience with the use of tirzepatide in patients with severe hepatic impairment is limited. Caution should be exercised when treating these patients with tirzepatide. Paediatric population: The safety and efficacy of tirzepatide in children aged less than 18 years have not yet been established. No data are available. Method of Administration: Mounjaro is to be injected subcutaneously in the abdomen, thigh or upper arm. The dose can be administered at any time of day, with or without meals. Injection sites should be rotated with each dose. If a patient also injects insulin, they should inject Mounjaro into a different injection site. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Special Warnings and Special Precautions for Use: Acute pancreatitis: Tirzepatide has not been studied in patients with a history of pancreatitis and should be used with caution in these patients. Acute pancreatitis has been reported in patients treated with tirzepatide. Patients should be informed of the symptoms of acute pancreatitis. If pancreatitis is suspected, tirzepatide should be discontinued. If the diagnosis of pancreatitis is confirmed, tirzepatide should not be restarted. In the absence of other signs and symptoms of acute pancreatitis, elevations in pancreatic enzymes alone are not predictive of acute pancreatitis. Hypoglycaemia: Patients receiving tirzepatide in combination with an insulin secretagogue (for example, a sulphonylurea) or insulin may have an increased risk of hypoglycaemia. The risk of hypoglycaemia may be lowered by a reduction in the dose of the insulin secretagogue or insulin. Gastrointestinal effects: Tirzepatide has been associated with gastrointestinal adverse reactions, which include nausea, vomiting, and diarrhoea. These adverse reactions may lead to dehydration, which could lead to a deterioration in renal function including acute renal failure. Patients treated with tirzepatide should be advised of the potential risk of dehydration, due to the gastrointestinal adverse reactions and take precautions to avoid fluid depletion and

electrolyte disturbances. This should particularly be considered in the elderly, who may be more susceptible to such complications. Severe gastrointestinal disease: Tirzepatide has not been studied in patients with severe gastrointestinal disease, including severe gastroparesis, and should be used with caution in these patients. Diabetic retinopathy: Tirzepatide has not been studied in patients with non-proliferative diabetic retinopathy requiring acute therapy, proliferative diabetic retinopathy or diabetic macular oedema, and should be used with caution in these patients with appropriate monitoring. Aspiration in association with general anaesthesia or deep sedation: Cases of pulmonary aspiration have been reported in patients receiving GLP-1 receptor agonists undergoing general anaesthesia or deep sedation. Therefore, the increased risk of residual gastric content due to delayed gastric emptying should be considered prior to performing procedures with general anaesthesia or deep sedation. Interaction with other medicinal products and other forms of interaction: Tirzepatide delays gastric emptying and thereby has the potential to impact the rate of absorption of concomitantly administered oral medicinal products. This effect, resulting in decreased  $C_{max}$  and a delayed  $t_{max}$ , is most pronounced at the time of tirzepatide treatment initiation. Fertility, Pregnancy and Lactation: Women of childbearing potential: Women of childbearing potential are recommended to use contraception when treated with tirzepatide. Pregnancy: There are no or a limited amount of data from the use of tirzepatide in pregnant women. Studies in animals have shown reproductive toxicity. Tirzepatide is not recommended during pregnancy and in women of childbearing potential not using contraception. If a patient wishes to become pregnant, or pregnancy occurs, tirzepatide should be discontinued. Tirzepatide should be discontinued at least 1 month before a planned pregnancy due to the long half-life. Breast-feeding: It is unknown whether tirzepatide is excreted in human milk. A risk to the newborn/infant cannot be excluded. A decision must be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue/abstain from tirzepatide therapy taking into account the benefit of breast-feeding for the child and the benefit of therapy for the woman. Fertility: The effect of tirzepatide on fertility in humans is unknown. Animal studies with tirzepatide did not indicate direct harmful effects with respect to fertility. Undesirable Effects: Incidence categories: very common:  $\geq 1/100$ ; common:  $\geq 1/100$  to  $< 1/10$ ; uncommon:  $\geq 1/1000$  to  $< 1/100$ ; rare:  $\geq 1/10000$  to  $< 1/1000$ ; very rare:  $< 1/10000$ . Adverse reactions that only apply to patients with type 2 diabetes mellitus are: decreased appetite (common), weight decreased (uncommon) and hypoglycaemia. Hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus is very common when used with sulphonylurea or insulin, is common when used with metformin and SGLT2, and is uncommon when used with metformin. Common adverse reaction that mainly applies to patients with overweight or obesity, with or without T2DM are dizziness, hypotension and hair loss. Nausea and diarrhoea are very common. Vomiting, abdominal pain and constipation were very common in weight management and OSA trials, and common in T2DM trials. Hypersensitivity reactions, dyspepsia, abdominal distension, eructation, flatulence, gastroesophageal reflux disease, fatigue, injection site reaction, heart rate increased, lipase increased, and amylase increased are common. Blood calcium increased was common in weight management trials, and uncommon in T2DM and OSA trials. Dysgeusia, dysaesthesia, cholelithiasis, cholecystitis, acute pancreatitis, delayed gastric emptying and injection site pain are uncommon. Anaphylactic reaction and angioedema from post-marketing reports were rare.

**Date of Preparation or last Review: based on SmPC dated December 2025. Date of first authorization: 15 September 2022.**  
Important Notice: Information prepared is for healthcare providers only. Mounjaro is dispersing upon prescription only. Before prescribing Mounjaro, you are kindly asked to read full Summary of Product Characteristics. More detailed information about Mounjaro and last revision of text Summary of Product Characteristics are available from Eli Lilly (affiliate name and contact details below) and on the European Medicines Agency (EMA) website: <https://www.ema.europa.eu>, and/or on European Commission website: <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/>  
Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorization of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475 Nicosia, Tel: +357 22608607, Fax: +357 22608669, [www.moh.gov.cy/phs](http://www.moh.gov.cy/phs).  
Legal Category POM, Marketing Authorisation Numbers and Holder: Mounjaro KwKwPen 2.5 mg/dose EU/1/22/1685/049; 5 mg/dose EU/1/22/1685/051; 7.5 mg/dose EU/1/22/1685/053; 10 mg/dose EU/1/22/1685/055; 12.5 mg/dose EU/1/22/1685/057; 15 mg/dose EU/1/22/1685/059. Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3526 BJ Utrecht, The Netherlands. Cost (indicative prices) MOUNJARO KWIKPEN 2.5MG/DOSE (4 DOSES) 240 € MOUNJARO KWIKPEN 5MG/DOSE (4 DOSES) 335 € MOUNJARO KWIKPEN 7.5MG/DOSE (4 DOSES) 410 € MOUNJARO KWIKPEN 10MG/DOSE (4 DOSES) 410 € MOUNJARO KWIKPEN 12.5 MG/DOSE (4 DOSES) 505 € MOUNJARO KWIKPEN 15 MG/DOSE (4 DOSES) 505 €  
Further information is Available From  
Local affiliate: Eli Lilly (Suisse) S.A. Representative Office Makariou III Avenue, Number 86, 4th Floor 3021 Andreas Christofides Building, Limassol Cyprus, Tel: +357 25818054, Fax: +357 25818055  
The local representative of the Marketing Authorisation Holder is Phadiso Ltd, Giannou Kranidioti 185, CY – 2234, Latsia, Cyprus.

### REFERENCES

1. Mounjaro. Summary of Product Characteristics. Eli Lilly and Company. 2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity.

N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038

The content is intended for Health Care Professionals only.

©Eli Lilly Cyprus Ltd. 2026. All rights reserved

**Lilly**  
A MEDICINE COMPANY

PP-TR-CY-0140

Date of Preparation: February 2026



# Rami Amlo<sup>®</sup>

Ramipril-Amlodipine

## Ramipril

## Amlodipine

Στην ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
της Υπέρτασης...



Πλήρης  
2πλό κάλυψη με  
συνδυασμό

**IASIS**  
PHARMA

CYPRUS

[www.iasispharma.gr](http://www.iasispharma.gr)

An IASIS PHARMA Company

Ελληνικό  
Φάρμακο

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την ΠΧΠ σαρώστε το QR code. Για να διαβάσετε την ΠΧΠ, PIN: 1234  
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (SPC),  
σκανάροντας το QR code. Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης  
διαθέσιμη από την εταιρεία IASIS PHARMA, τηλ.: 210 2311031, e-mail: [marketing@iasispharma.gr](mailto:marketing@iasispharma.gr)



## **SPEAKERS & CHAIRS**

## Invited Foreign Speakers

### **Dr Mark Abela**

Cardiologist with subspecialty in Sports Cardiology – Mater Dei hospital / Malta,  
St. George's University Hospital - London

### **Professor Charalambos Antoniades**

Professor of Cardiovascular Medicine  
University of Oxford

### **Dr Alex Borg**

Cardiologist with subspecialty in cardiac imaging – Mater Dei Hospital / Malta  
Maltese Representative for Cardiology Core Examination of the European Society of Cardiology

### **Dr Elie Chammas**

Professor of Cardiology - Associate Dean for Clinical Affairs, Balamand University / Beirut  
Director, Division of Cardiology, Clemenceau Medical center  
Past President of the Lebanese Society of Cardiology

### **Professor Stavros Drakos**

Professor of Medicine and the Co-Director of the Cardiovascular, Renal, and Metabolism Center (CRMC)  
at the University of Utah Health & School of Medicine  
Co-Director of the Heart Failure & Transplant Section and Medical Director Mechanical Circulatory  
Support Program

### **Professor Lambros Michalis**

Professor of Cardiology – Ioannina Medical School – Ioannina  
President-elect of the Hellenic Cardiological Society

### **Professor Nestoras Papadopoulos**

Professor of Cardiothoracic Surgery – University of Zurich / Switzerland

### **Dr Mario Petrou**

Cardiothoracic Surgeon – Royal Brompton and Harefield Hospitals

### **Professor Georges Saade**

Bellevue Medical Center Clinical - University of Balamand / Beirut  
President of the Lebanese Society of Cardiology



## **Professor Stavros Stavrakis**

Clinical Electrophysiologist and Physician Scientist at the University of Oklahoma  
Professor of Medicine and Director of Electrophysiology Department

## **Professor Konstantinos Toutouzas**

Professor of Cardiology – Hippokration Hospital – Athens  
President of the Hellenic Cardiological Society

## **Professor Vassilios Vassiliou**

Clinical Professor in Cardiac Medicine - University of East Anglia  
Honorary consultant cardiologist - Norfolk and Norwich University Hospital,  
Norwich and Addenbrooke's and Royal Papworth Hospital, Cambridge

## Invited Speakers from Cyprus

### **Dr Theodoros Christodoulides**

President of the Heart Failure Working Group, Cyprus Society of Cardiology  
Past President of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Theodoros Christofides**

Cardiologist – Electrophysiologist – Nicosia General Hospital

### **Dr Thrassos Constantinides**

Cardiologist  
President of the Cyprus Working Group on Cardiovascular Imaging  
EACVI HIT Ambassador for Cyprus  
EACVI Transthoracic Echocardiography Certification  
EACVI Transoesophageal Echocardiography Certification  
SCMR Level III Certification  
Member of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Georgia Daniel**

Cardiologist – Nicosia  
President of the Cardiomyopathies Working Group, Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Christos Eftychiou**

Interventional Cardiologist  
Director of the Cardiology Clinic, Nicosia General Hospital  
Member of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Georgios Georgiou**

Interventional Cardiologist

Director of the Cardiology Clinic, Apollonion Private Hospital, Nicosia

Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Daniel Hadjifotiades**

Nuclear Medicine Specialist – Limassol

**Dr Hera Heracleous**

Cardiologist

Immediate Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Antonis Ioannou**

Cardiologist – Nicosia

Member of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Andreas Mitsis**

Interventional Cardiologist – Nicosia General Hospital

**Dr Kyriakos Mouyis**

Cardiologist – Electrophysiologist – Nicosia

**Dr Theodoros Ntoskas**

Cardiovascular Imaging Specialist – Nicosia

**Mrs Chara Skouteli**

PhD Candidate with the Department of Computer Science of the University of Cyprus


**Dr Panayiotis Tsiverdis**

Cardiovascular Imaging Specialist – Limassol

**Dr Kyriakos Yiangou**

Cardiologist

President of the Cyprus Society of Cardiology



## Menarini Hellas

	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
<b>OLARTAN® - ΣΕ 3 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ</b>			<b>ORIZAL® - ΣΕ 3 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ</b>		
OLARTAN® F.C TAB 10MG BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	9,94 €	2,11 €	ORIZAL® F.C TAB (20/5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	12,12 €	0,00 €
OLARTAN® F.C TAB 20MG BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	13,89 €	5,73 €	ORIZAL® F.C TAB (40/10)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	15,21 €	0,00 €
OLARTAN® F.C TAB 40MG BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	12,43 €	4,03 €	ORIZAL® F.C TAB (40/5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	14,51 €	0,00 €
<b>OLARTAN PLUS® - ΣΕ 4 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ</b>			<b>ORIZAL PLUS® - ΣΕ 5 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ</b>		
OLARTAN PLUS® F.C TAB (20/12,5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	13,69 €	2,50 €	ORIZAL PLUS® F.C TAB (20/5/12,5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	16,76 €	3,65 €
OLARTAN PLUS® F.C TAB (20/25)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	13,76 €	0,00 €	ORIZAL PLUS® F.C TAB (40/10/12,5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	21,50 €	7,47 €
OLARTAN PLUS® F.C TAB (40/12,5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	12,89 €	1,09 €	ORIZAL PLUS® F.C TAB (40/10/25)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	21,96 €	7,74 €
OLARTAN PLUS® F.C TAB (40/25)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	12,89 €	0,72 €	ORIZAL PLUS® F.C TAB (40/5/12,5)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	20,91 €	8,01 €
			ORIZAL PLUS® F.C TAB (40/5/25)MG / TAB BTx28 (σε BLISTERS ALUMINIUM)	21,51 €	8,41 €

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:** 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan® 10mg, 20mg, 40mg upd 02/2025. 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus® 20mg/12,5mg, 20/25mg upd 02/2025. 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus® 40mg/12,5mg, 40/25mg upd 02/2025. 4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal® 20mg/5mg, 40mg/5mg, 40mg/10mg upd 05/2025. 5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus® 20mg/5mg/12,5mg, 40mg/5mg/12,5mg, 40mg/10mg/12,5mg, 40mg/10mg/25mg/40mg/5mg/25mg upd 05/2025.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτονται μέσω του ΓεΣΥ. Τα παρόντα ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν απήματος στον κάτωθι άδεια κυκλοφορίας.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπεριλαμβανοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"  
Με την άδεια της DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH



CY-OLA-242-2026



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr  
Τοπικός διανομέας: Kypropharm LTD - Άρως 4, Λατσία 2234, Λευκωσία, Τ.: 22434699, F.: 22438043

## Chairs

### **Dr Petros Agathangelou**

Specialist Internist (Physician) – Specialist Cardiologist  
President of the Cyprus Medical Association (CyMA)  
Past President of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Loizos Antoniadis**

Cardiologist  
Past President of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Panayiotis Avraamides**

Clinical Professor of Cardiology, University of Nicosia Medical School  
Cardiologist, University of Nicosia Medical Centre  
Interventional Cardiologist and Electrophysiologist, El Greco Medical Centre  
Secretary of the Working Group on Cardiac Arrhythmias  
Past President of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Theodoros Christodoulides**

President of the Heart Failure Working Group, Cyprus Society of Cardiology  
Past President of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Savvas Constantinides**

Consultant Interventional Cardiologist

### **Dr Thrastos Constantinides**

Cardiologist  
President of the Cyprus Working Group on Cardiovascular Imaging  
EACVI HIT Ambassador for Cyprus  
EACVI Transthoracic Echocardiography Certification  
EACVI Transoesophageal Echocardiography Certification  
SCMR Level III Certification  
Member of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Evagoras Economides**

Associate Professor, University of Nicosia Medical School  
Cardiologist, Aretaeio Hospital, Nicosia  
Assistant Secretary of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Christos Eftychiou**

Interventional Cardiologist  
Director of the Cardiology Clinic, Nicosia General Hospital  
Member of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

### **Dr Erotokritos Evangelakis**

Cardiac Surgeon  
Director of Cardiothoracic Department, Nicosia General Hospital

**Dr Georgios Georgiou**

Interventional Cardiologist

Director of the Cardiology Clinic, Apollonion Private Hospital, Nicosia

Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Hera Heracleous**

Cardiologist

Immediate Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Antonis Ioannou**

Cardiologist

Member of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Maria Karakyriou**

Cardiologist

Secretary of the Board of Directors of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Joseph Moutiris**

Clinical Professor of Cardiology, University of Nicosia Medical School

Vice President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Michael Myrianthefs**

Cardiologist, "Apostolos Loukas" Medical Center, Nicosia

Past Director of the Cardiology Clinic, Nicosia General Hospital

Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Professor Evagoras Nicolaidis**

Cardiologist

Professor of Postgraduate Medicine and Director of Postgraduate General Medicine,  
University of Nicosia Medical School

Past Director of the Cardiology Clinic, Nicosia General Hospital

Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Pambis Nicolaidis**

Cardiologist, American Medical Center / American Medical Institute

Past President of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Nicoletta Orphanou**

Cardiologist

Treasurer of the Cyprus Society of Cardiology

**Dr Kyriakos Yiangou**

Cardiologist

President of the Cyprus Society of Cardiology

Η RNAi επιλογή στην ATTR-CM<sup>1,2</sup>  
που αναστέλλει την παραγωγή της τρανσθυρετίνης στην πηγή<sup>1,2</sup>

ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ATTR-CM ΤΟ ΑΜΒΥΤΤΡΑ ΠΕΤΥΧΕ:

**28%** μείωση του κινδύνου υποτροπιάζοντων  
καρδιαγγειακών συμβάντων\* και θνησιμότητας από κάθε αίτιο<sup>2</sup>

**36%** μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε αίτιο<sup>3</sup>

**RAPID**

**KNOCKDOWN**



Για την ΠΧΠ σκανάρετε  
τον κωδικό QR

Το AMVUTTRA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2 (hATTR-PN) και για τη θεραπεία της φυσικού τύπου ή κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)<sup>1</sup>



Η συνιστώμενη δόση του Amvuttra είναι 25 mg, χορηγούμενη με υποδόρια ένεση άπαξ κάθε 3 μήνες<sup>1</sup>

ATTR-CM, transthyretin amyloid cardiomyopathy; RNAi, ribonucleic acid interference; TTR, transthyretin.  
\*νοσηλίες λόγω καρδιαγγειακών συμβάντων και επείγουσες επισκέψεις για καρδιακή ανεπάρκεια

Το AMVUTTRA® ήταν γενικά καλά ανεκτό με προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών αντίστοιχο αυτού του εικονικού φαρμάκου.<sup>2,3</sup>

Το προφίλ ασφαλείας του AMVUTTRA® χαρακτηρίστηκε με βάση τα δεδομένα από τις τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες φάσης 3, HELIOS-A και HELIOS-B. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων των μελετών HELIOS-A και HELIOS-B ήταν αντιδράσεις στη θέση της ένεσης οι οποίες ήταν ήπιες, παροδικές και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας και τρανσαμνάση της αλανίνης, αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένες.<sup>1</sup>

**Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Genesis Pharma (Cyprus) Ltd**

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Μέγιστη Λιανική Τιμή 87,677.59€

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:1. AMVUTTRA® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 2. Fontana M, et al. N Engl J Med 2025;392:33-44; 3. Witteles RM, et al. JACC 2025;85(20):1959-70

# SERVIER

moved by you

## Ανεξάρτητος Φαρμακευτικός Όμιλος, που διοικείται από ένα μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα

Για την  
έγκαιρη διάγνωση



### #LegsFirst

\* Μήνας ευαισθητοποίησης για τα πόδια

### #BecauseIsayso

### Για την αποτελεσματική ρύθμιση & παραμονή στη θεραπεία



**COVERSYL**\*  
περιδωρολίλη



**PRETERAX**\*  
περιδωρολίλη, υδραλοθονίλη



**COVERAM**\*  
περιδωρολίλη, αμιλοδιπίνη



**TRIPLIXAM**\*  
περιδωρολίλη, ηδισταμίνη, αμιλοδιπίνη



**COSYREL**\*  
βασπιραλόλη, περιδωρολίλη

**LIPOCOMB**\*  
ροσουβαστατίνη, εζετιμίμη



**CHOLZET**\*  
ατορβαστατίνη, εζετιμίμη



**PROCORALAN**\*  
ιβαμραδίλη



**daflon**\*\*



### Για τη βελτίωση προήλωσης στην αγωγή



Μη γίνεσαι γιατρός  
του εαυτού σου



**COVERSYL** (5) mg/tab: ΛΤ 13,41 €, **COVERSYL** (10) mg/tab: ΛΤ 13,49 €, **PRETERAX** (5+1,25) mg/tab ΛΤ: 11,15 €, **PRETERAX** (10+2,5) mg/tab ΛΤ: 13,44 €, **COVERAM** (5+5) mg ΛΤ: 13,77 €, **COVERAM** (5+10) mg ΛΤ: 13,71 €, **COVERAM** (10+5) mg ΛΤ: 14,32 €, **COVERAM** (10+10) mg ΛΤ: 15,72 €, **TRIPLIXAM** (5+1,25+5) mg/tab ΛΤ: 13,17 €, **TRIPLIXAM** (5+1,25+10) mg/tab ΛΤ: 14,33 €, **TRIPLIXAM** (10+2,5+5) mg/tab ΛΤ: 18,01 €, **TRIPLIXAM** (10+2,5+10) mg/tab ΛΤ: 18,38 €, **COSYREL** (5+5) mg/tab ΛΤ €10,50, **COSYREL** (5+10) mg/tab ΛΤ €13,89, **COSYREL** (10+5) mg/tab ΛΤ €12,20, **COSYREL** (10+10) mg/tab ΛΤ €14,70, **LIPOCOMB** (10+10) mg/cap ΛΤ 25,26 €, **LIPOCOMB** (20+10) mg/cap ΛΤ 27,22 €, **CHOLZET** (10+10) mg/cap ΛΤ 28,08 €, **CHOLZET** (20+10) mg/cap ΛΤ 29,78 €, **CHOLZET** (40+10) mg/cap ΛΤ 31,19 €, **PROCORALAN** 5 mg ΛΤ €29,77, **PROCORALAN** 7,5 mg ΛΤ 29,86 €, **DAFLON** (BTX60) Ενδεικτική Λ.Τ. 22,14 €.

\*Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται Ιατρική συνταγή

\*\*Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο δεν απαιτείται Ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ  
ΟΜΙΛΟΣ



## Cardiology Residents

Saturday, 14 March, 14:00 - 15:00

**P01** **Difficulty evaluating the systolic heart function in a patient with heterotopic heart transplantation.**

*Giannis Kyriakou<sup>1</sup>, Dimitrios Tsiapas<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Cardiology Dept - Limassol GH

<sup>2</sup> Onassis Cardiac Surgery Center - Athen

**P02** **Early Mechanical Circulatory Support with Impella CP in Fulminant Myocarditis Leading to Recovery of Left Ventricular Function – Case series.**

*Elina Khattab, Andreas Mitsis, Kimon Myriantopoulos, Nikolaos Eteocleous, Marios Ioannides, Grikor Simamonian, Michaela Kyriakou, Christos Eftychiou*

*Cardiology Dept - Nicosia GH*

**P03** **30-Day Outcomes of Transfemoral Valve-in-Valve Transcatheter Aortic Valve Implantation from Nicosia GH TAVI registry.**

*Georgia Karmioti, Nikolaos Eteocleous, Ioannis Zittis, Kimon Myriantopoulos, Andreas Mitsis, Christos Eftychiou*

*Cardiology Dept - Nicosia GH*

**P04** **Ajmaline challenge for Brugada Syndrome: the experience of the Nicosia General Hospital in the era of the new Cyprus Healthcare System.**

*Varnavas Demetriades, Artemis Fouseki, Marios Ioannides, Christos Katsikas, Theodoros Christophides*

*Cardiology Dept - Nicosia GH*



## Medical Students

Saturday, 14 March, 17:00 - 17:30

- |     |  |
|-----|--|
| P05 | <b>LDL-C Fourfold Above Target in Post-PCI Secondary Prevention: Indication for PCSK9 Inhibition.</b><br><i>Khadijah Aliyu Aziz, Maria Gounari</i>                           |
| P06 | <b>Multifactorial Heart Failure in an Elderly Male With Consideration of ICD Upgrade to CRT-D.</b><br><i>Alec Leon Petrou, Chrisovalantou Maria Seindis, Joseph Moutiris</i> |
| P07 | <b>Blood Pressure Control In Patients with diagnosed Hypertension.</b><br><i>Eleanor Froneman, Mahmoud Younis, Maisara Maher</i>   |
| P08 | <b>Symptomatic Myocardial Bridging in a Young Adult Medical Student.</b><br><i>PJ van Heerden, WF Travers</i>  |

# IF YOU COULD PREVENT SHINGLES, WHY WOULDN'T YOU?

**Now** is the time to help protect against shingles.

Patient  
portrayal.

**99.5%**  
OF PEOPLE ≥50 YEARS  
OLD ARE INFECTED

with the varicella zoster virus.<sup>1,2\*</sup>

In **1 out of 3 people**,  
the dormant virus  
reactivates in their  
lifetime and causes  
shingles.<sup>1\*</sup>

**A strong recommendation for SHINGRIX starts with you.**

In Cyprus, shingles vaccination is recommended and reimbursed for adults 60 years and older, as well as for people aged 18 years and older at increased risk of developing shingles.<sup>3</sup>

**Recommend SHINGRIX confidently to patients ≥60 years old.**

**Vaccinate your patients in line with the National Vaccination Program.<sup>3</sup> Follow up with your patients to ensure 2-dose completion.<sup>4</sup>**

References: 1. Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF; Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep.* 2008;57(RR-5):1-30. 2. Kilgore PE, Kruszon-Moran D, Seward JF, et al. Varicella in Americans from NHANES III: implications for control through routine immunization. *J Med Virol.* 2003;70(suppl 1):S111-S118. 3. Ministry of Health. National Vaccination Program for Adults and Special Groups 2025. <https://www.gov.cy/media/sites/24/2025/03/ΕΘΝΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-21-3-2025.pdf> (accessed on the 5th September 2025). 4. GlaxoSmithKline. SHINGRIX European Public Assessment Report, Annex I: Summary of Product Characteristics. Updated August 2025. Accessed September 2025. Available at: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-information_en.pdf)

US data;<sup>1</sup> may not be representative of global data

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

©GSK or licensor 2025

Σαρώστε για την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (QR Code)

Φαρμακευτικό Προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή  
Shingrix Α.Τ ΚΥΠΡΟΥ : 213.51€  
Πλήρως επιχορηγημένο από το ΓΕΣΥ

Shingrix/Adver/Cy/Com/13\_09/25

 **PAPAELLINAS**  
GROUP

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας  
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

 **SHINGRIX**  
(ZOSTER VACCINE  
RECOMBINANT, ADJUVANTED) 

# Jardiance®

(εμπαγλιφλοζίνη)  
10mg, 25mg

**Θεραπευτικές ενδείξεις JARDIANCE®:** Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Το Jardiance® ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως επικουρικό της δίαιτας και της άσκησης: - ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας - επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. **Καρδιακή ανεπάρκεια:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. **Χρόνια νεφρική νόσος:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 10 Φεβρουαρίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 29,48€, Λ.Τ.: 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 30,14€, Λ.Τ.: 47,73€. Τιμές Κύπρου: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λ.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 51,19€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λ.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,73€. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΌΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την  
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ούρησης και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχαρτη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-328.




Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Τηλ: 210 89 06 300.  
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτη 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 424 618.  
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com  
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βασ. Παύλου Α' 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: +357 22 863100.

## GOLD SPONSORS



## SILVER SPONSORS



## EXHIBITORS



Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ AMGEN ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



## SPONSORS

